



Obrázek 1: Vlevo: Leonhard Euler. Vpravo: Desetifranková bankovka.

**Leonhard Paul Euler** (15. dubna 1707 Basilej, Švýcarsko – 18. září 1783 Petrohrad, Rusko) je považován za nejlepšího matematika 18. století a za jednoho z nejlepších matematiků vůbec. Provedl mnoho objevů na poli diferenciálního počtu a teorie grafů. Eulerův portrét se objevil na desetifranku šesté série švýcarské bankovky, viz Obrázek 1.

# 1 Životopis

## 1.1 Mladí

Euler se v roce 1707 ve švýcarské Basileji. Mladého Eulera významně ovlivnil přítel jeho otce, Johann Bernoulli, který byl považován za předního evropského matematika. V roce 1720 vstoupil Euler na Basilejskou univerzitu. V roce 1726 složil Euler doktorské zkoušky prací na téma rychlosti zvuku.

## 1.2 Vědecká kariéra

### Petrohrad

V té době pracovali dva Bernoulliho synové, Daniel a Nicolas, na ruské akademii věd v Petrohradě. Daniel doporučil Eulera na post fyziologa. Poté, co v roce 1727 Euler přijel do Petrohradu, byl povýšen ze svého nižšího postu na lékařské katedře na akademii do vyšší pozice na katedře matematiky.

## Berlín

Znepokojen pokračujícími nepokoji v Rusku, opustil Euler v roce 1741 Petrohrad. Dostal místo na berlínské akademii, které mu bylo nabídnuto Fridrichem II. Velikým. V Berlíně strávil 25 let a napsal zde přes 380 prací. Nakonec však byl Euler navzdory svým velkým zásluhám o prestiž akademie nucen z Berlína odejít.

## Návrat do Ruska

Po nástupu Kateřiny Veliké se situace v Rusku opět prudce zlepšila, proto Euler přijal v roce 1766 nabídku k návratu na Petrohradskou akademii a strávil tam zbytek života.

### 1.3 Zhoršení zraku

Během kariéry se Eulerovi zhoršil zrak. V roce 1735 oslepl téměř úplně na pravé oko. Později mu byl navíc nalezen v levém oku šedý zákal, což ho téměř zcela oslepilo. Jeho slepota neměla ale žádný vliv na jeho produktivitu. Díky svému písáři v roce 1775 produkoval Euler jeden matematický list týdně. 18. září 1783 Euler zemřel v Petrohradu (viz též Sekce 1.2) na mozkovou mrtvici.

## 2 Některé matematické objekty pojmenované po Leonhardu Eulerovi

**Eulerova cihla** Eulerova cihla je v matematice kvádr, jehož hrany i stěnové uhlopříčky mají celočíselnou délku. Tj. je řešením následující soustavy  *rovnic:*

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= d^2 \\ a^2 + c^2 &= e^2 \\ b^2 + c^2 &= f^2 \end{aligned}$$

Nejmenší Eulerova cihla, nalezena Paulem Halckem v roce 1719, má délky hran 240, 117 a 44.

**Eulerovo číslo** Eulerovo číslo (obvykle je značeno písmenem  $e$ ) je jedna ze základních matematických konstant. Jeho přibližná hodnota je

$$e \approx 2,7182818284\dots$$

Eulerovo číslo má několik alternativních ekvivalentních definic. Nejčastější jsou:

1. Jako limita následující posloupnosti:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

2. Jako součet následující nekonečné řady:  $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ .
3. Jako jediné číslo  $x > 0$ , pro které platí, že  $\int_1^x \frac{dt}{t} = 1$ .

**Eulerova funkce** Eulerova funkce  $\varphi(n)$  je počet všech  $k \in \mathbb{N}$  takových, že  $1 \leq k \leq n$  a  $\text{NSD}(k, n) = 1$ , tedy  $k$  a  $n$  jsou *nesoudělná* čísla. Ihned z definice jsou patrné následující vlastnosti:

- $\varphi(1) = 1$ ,
- $\varphi(p) = p - 1$  pro  $p$  prvočíslo,
- $\varphi(p^m) = (p - 1) \cdot p^{m-1}$  pro  $p$  prvočíslo a exponent  $m \in \mathbb{N}$ .

**Eulerův vzorec** Eulerův vzorec určuje vztah mezi goniometrickými funkcemi a exponenciální funkcí:

$$e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi. \quad (1)$$

**Eulerova rovnost** Eulerova rovnost (také Eulerova identita) je základní vzorec komplexní analýzy. Svým jednoduchým a elegantním vyjádřením  $e^{i\pi} + 1 = 0$  a fundamentálním významem připomíná Einsteinovu rovnici. Eulerova rovnost je přímým důsledkem Eulerova vzorce (1).

### Eulerův rotační teorém [1, s. 202]

**Věta 1** (Eulerova). *Quomodo cunque sphaera circa centrum suum conuertatur, semper assignari potest diameter, cuius directio in situ translato conueniat cum situ initiali.*

*Důkaz.* Důkaz se opírá o ekvivalence ortogonálních matic s následující maticí nebo její vertikální reflexí

$$\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi.$$

Celý důkaz a diskusi k Eulerově větě je možno nalézt v anglickém překladu [2].

□

## Použité značení

značka	význam
$e$	Eulerovo číslo
$\varphi$	Eulerova funkce
$p$	prvočíslo
$i$	komplexní jednotka

Tabulka 1: Seznam použitého značení.

## Reference

- [1] Leonhard Euler. Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum. *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae*, 20:189–207, 1775.
- [2] Bob Palais, Richard Palais, and Stephen Rodi. A disorienting look at Euler’s theorem on the axis of a rotation. *Amer. Math. Monthly*, 116(10):892–909, 2009.